

## Eliquis<sup>®</sup> ha cambiado la práctica clínica<sup>1</sup>



2011

The NEW ENGLAND  
JOURNAL of MEDICINE

Apixaban versus Warfarin in Patients  
with Atrial Fibrillation

Christopher B. Granger, M.D., John H. Alexander, M.D., M.H.S., John D. Mahaffey, M.D., Renato D. Lopes, M.D., Ph.D., Blane M. Hylek, M.D., M.P.H., Michael Hanna, M.D., Hassan F. Al-Shareef, Ph.D., Jack Ansell, M.D., Dan Atar, M.D., Akhlesh Khanna, M.D., Ph.D., M. Carlos Riens, M.D., Robert D. Stewart, M.D., J. Donald Easton, M.D., Justin A. Ezekowitz, M.B., B.Ch., Greg Flaker, M.D., David Garcia, M.D., Margarida Castellón, Ph.D., Bernard J. Gersh, M.D., Sangeeta Kalish, M.D., Ph.D., Shinya Goto, M.D., Antonia C. Hernandez, M.D., Stefan H. Hohnloser, M.D., John Himmelfarb, M.D., Puneet Mohan, M.D., Ph.D., Pooja Parikh, M.D., Brad S. Lewis, M.D., Joon-Geun Song, M.D., Peter Stein, M.D., Alexander Pothoven, M.D., Frank W.A. Verheugt, M.D., Ph.D., Jun Zhu, M.D., and Lars Wallentin, M.D., Ph.D., for the ARISTOTLE Committees and Investigators<sup>1</sup>



## ARISTOTLE

2021



Incluido en el **DRAZEN'S DOZEN - NEJM** en mayo 2019 como uno de los 12 artículos que han cambiado la práctica clínica desde el 2000, según el Dr. Drazen, Editor en jefe durante 19 años del NEJM<sup>1</sup>



32

Presentaciones orales



35

Congresos



78

Artículos publicados



67

Presentaciones formato póster

## Resultados consistentes en RWE<sup>2</sup>



El riesgo de sangrado mayor fue un **42% más alto con edoxabán<sup>2</sup>**




Figura traducida de Chiv R, et al. 2024.<sup>2</sup>

## ÚNICO ACOD SUPERIOR

en tres criterios fundamentales vs. Warfarina<sup>3</sup>

Prevención  
en ictus/ES<sup>3</sup>

RRR  
**21%**  
SUPERIOR



[HR=0,79; IC del 95%: (0,66-0,95); p=0,01]

Riesgo  
de sangrado  
mayor<sup>3</sup>

RRR  
**31%**  
SUPERIOR



[HR=0,69; IC del 95%: (0,60-0,80); p<0,001]

Mortalidad  
por cualquier  
causa<sup>3</sup>

RRR  
**11%**  
SUPERIOR



[HR=0,89; IC del 95%: (0,80-0,99); p=0,047]

ACOD: anticoagulante oral de acción directa; ES: embolia sistémica; FANV: Fibrilación auricular no valvular; HR: Hazard ratio; IC: Intervalo de confianza; RRR: Reducción relativa del riesgo; RWE: Real world evidence.

1. Drazen JM. Drazen's Dozen: Articles that changed practice since 2000 [Internet]. Waltham, EE. UU.: The New England Journal of Medicine; 2019 [citado 19 julio 2020]. Disponible en: <https://cdn.nejm.org/pdf/Drazen's-Dozen.pdf>. 2. Chiv R, et al. Effectiveness and Safety of Edoxaban Compared With Apixaban in Elderly Patients With Nonvalvular Atrial Fibrillation: A Real-World Population-Based Cohort Study. Stroke. 2024;55(5):1161-1170. 3. Granger CB, et al. ARISTOTLE Committees and Investigators. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011;365(11):981-92.

Este material es solo para su uso personal. No está permitida su reproducción o distribución.

432-ES-2500006 Marzo 2025

Si desea obtener más información, consulte la Ficha Técnica autorizada de Eliquis<sup>®</sup> que se facilita.

Ficha Técnica disponible para descargar escaneando el QR:

